

毛髪治療薬(男性用) 同意書

プロペシア錠、フィナステリド錠

1日1回、服用してください。効果が確認できるまで数か月間程かかることがあります。副作用として食欲不振、全身倦怠感、抑うつ症状、勃起不全、性欲減退、精液量の減少、精液の質の低下、肝機能障害、アレルギー症状などがあります。またミノキシジル内服と併用されている方は、ミノキシジルの作用によって、使い始めは新しい毛が生えることにより薄い毛が抜けるため抜け毛が増えることがあります。

プロペシア錠を服用中の患者様では、**前立腺癌検査で測定される PSA という検査値が約 50%低下するので**、評価の際には注意が必要です。検査の際には、担当医療機関に服用していることをお知らせ下さい。**プロペシア錠を服用中の方は献血できません**。献血をする場合は、服用中止または終了後 1 ヶ月間空けて下さい。服用時には**定期的に血液検査で肝機能をチェックさせて頂きます**。肝機能の採血は初回購入時、その後は服用から半年毎に行います。他院で 3 か月以内に採血をされている方は、そちらの結果で代用させて頂きますのでご提示をよろしくお願い致します。データの提示、当院での採血に同意いただけない場合は、薬剤副作用に対する責任は負いかねますのでご了承ください。また一旦処方させていただいた薬の返品、返金はできませんのでご了承ください。

採血1回 1500 円 (自己負担)

【取扱いの注意事項】

プロペシア錠を割って服用しないで下さい。女性(授乳中、妊娠中、妊娠の可能性のある方)、小児が、プロペシア錠を服用したり、破損したプロペシア錠に触れて有効成分が吸収されてしまうと、男子胎児の生殖器官等の正常発育に影響を及ぼすおそれがあります。また、プロペシア錠を割って服用した場合の安全性や有効性も確立されておりません。

外用薬 ロゲイン 5%(男性用)

ミノキシジルという成分の男性用薬用発毛剤です。壮年性脱毛症における発毛・育毛および、脱毛(抜け毛)の進行予防に効果的です。毛細血管を拡張させ、頭皮の血流を促し、発毛を促進させます。副作用として、頭皮のかぶれ、発赤、かゆみなどがあります。

上記をよく理解、同意の上、該当医薬品を購入することに同意いたします。

年 月 日

署名 _____

よつば会クリニック 名古屋院